



Melon noir

Vass7R04s461-465



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1904

*Vass7R04s461-465
Melon noir 0Mtp1904*

0 SP.


31.07

✓6

0Mtp1904


Melon noir

Vass7R04s461-465









Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2012 **3034** Observateur :
CodeVar : 0 CodeIntro : 0Mtp1904 NomVar : Cépage non identifié
Nom introduction : Melon noir Emplacement : **Vass7R04s461-465**

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	4		27/3	6	
2	4	27/3	29/3	5	
3	4		28/3	3	
4					
5					
Moyenne	12		28/3	14	12

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
25.05	29.05	50-55%	24.07	01.08 +1	13.09	

SUIVI DE MATURITE							
Dates	07.08	20.08	30.08	06.09	13.09		
IR	18	16-18,2	proche DM	encore A	N'a pas		
Valeur papier PH			mg. un peu	Sanitaire	6. DM		

Remarque : revoir 01.08. ok
Revoir
A>.
et peu sucré.
Coul = Rg
Sav = N
pép = Oui

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2013
CodeVar : 0
CodeIntro : 0Mtp1904
Nom Var : Melon noir
Observateur :
Emplacement : Vass7R04s456-460

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE					
Oiv 459	Degré de résistance Botrytis grappe		très faible ou faible	moyenne	élevée ou très élevée

Taillé
le 22/3
par H

Rehaillé
grappe
25/3

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6	30/3	5/4	8	
2	6	10/4	16/4	3	
3	8	1/4	10/4	17	
4	vide	\	\	\	\
5	vide	\	\	\	\
Moyenne	20		10/4	28	14

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
06.06	10.06		06/08	12/08	13.09	

SUIVI DE MATURITE				
Dates	29.8	09.09	06.09	13.09
IR	20	20	20	21,5
Valeur papier PH				

Remarque : grappes du bas (base sache) avancées
mais grappes tiers médian + sup.
pas veres

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2013 2034
CodeVar : 0 CodeIntro : 0Mtp1904
Nom Var : Melon noir
Observateur :
Emplacement : Vass7R04s461-465

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance Botrytis grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Taillé le 22/3/13
puis retouché par coupe 25/3

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	7	29/3	8/4	12	
2	4	29/3	2/4	5	
3	3	2/4	5/4	5	
4	vide				
5	vide				
Moyenne	14		5/4	22	16

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
03/06	08/06/13		06/08	12/08.	13.09	

SUIVI DE MATURITE				
Dates	29.8	02.09	06.09	13.09
IR	19	20.5	21	22
Valeur papier PH				

Remarque : Nb baies rabougries